

Nie bój się kolki

Autor: Maike RAKEBRANDT; Senior Product Management Equine & Pet, Leiber GmbH

Stresujące sytuacje mogą mieć negatywny wpływ na trawienie i tym samym znacząco zwiększać ryzyko wystąpienia kolki.



Do czynników stresowych zaliczają się między innymi:

- | transport, zawody, ujeżdżanie
- | zaawansowana ciąża, poród
- | zmiana paszy
- | niska jakość paszy podstawowej
- | stres społeczny w hodowli grupowej, zmiana stajni
- | niedostatek ruchu
- | kuracje odrobaczające lub zastosowanie leków takich jak antybiotyki lub kortyzon

Mniej złych fermentacji, mniejszy stopień zakwaszenia

Drożdże piwne przywracają równowagę biologiczną flory jelitowej, tzw. eubiozę. Poprawiają rozkład surowego błonnika i strawność składników odżywczych. Bogate nośniki błonnika zawarte w produktach Leiber YeaFi® wspomagają dietetyczne właściwości drożdży piwnych. Młóto browarniane jest cenne i bardzo smaczne dla konia. Młóto browarniane zawierające 5% włókna surowego jest bardzo bogate w błonnik. Szczególnie ważny jest tu wysoki udział surowego błonnika strukturalnego. Wysoka zawartość błonnika idealnie sprawdza się jako pożywka dla mikroflory, szczególnie w jelicie grubym. Młóto browarniane przyczynia się zatem do wzmocnienia korzystnej mikroflory. Młóto browarniane pozytywnie wpływa także na zdolność wiązania wody – to prawdziwa zaleta w przypadku papkowatych stolców, biegunek czy wody kałowej. Wysoka zawartość pektyn w wyciekach jabłkowych i niemielasowanych wysłodkach buraczanych dodatkowo wspomaga stabilizację

Chcesz dowiedzieć się więcej o produkcji, różnicach, działaniu i praktycznym zastosowaniu?

leiber-pferd.de/pl/



Od 1954 roku stosujemy upcykling na poziomie rynków światowych i obserwujemy środowisko oraz klimat.

mikroflory w przewodzie pokarmowym.

Zawsze warto dążyć do utrzymania zdrowej flory jelitowej, ponieważ tylko w ten sposób można zapewnić mniej złych fermentacji w jelitach i mniejszy poziom zakwaszenia. Zdrowa flora jelitowa to mniejsze ryzyko kwasicy, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia kolki.

Czym właściwie jest kolka?

Kolka to zbiorcze pojęcie określające objawy bólowe, których przyczyny należy szukać w jamie brzusznej. Istnieje wiele rodzajów kolki, których przyczyną mogą być przede wszystkim błędy w żywieniu. Rozróżnia się między innymi kolkę zaparciową, kolkę gazową, przeciążenie żołądka, skręty jelit, kolki spastyczne i dysfagie.

Drożdże piwne to sprawdzona pasza o długiej tradycji w żywieniu koni

Ich stosowanie zostało wypróbowane i przetestowane w praktyce i często jest zalecane w literaturze naukowej, na przykład przy:

- | przewlekłej niewydolności lub usuniętych odcinkach jelit (COENEN i VERVUERT 2020)
- | podatności na kolkę lub biegunkę (ZENTEK i in. 2008, COENEN i VERVUERT 2020)
- | długotrwałych zaburzeniach trawienia, uszkodzeniach flory jelitowej, utracie apetytu lub ogólnym osłabieniu wydolności (COENEN i VERVUERT 2020)
- | miopatiach związanych z wysiłkiem fizycznym lub chorobach wątroby (COENEN i VERVUERT 2020)